

尿・糞便 検査

	J-ド No.	項目名 (別名・略称)	検査方法 基準範囲	検体名 必要量	容器	保存	所要 日数	採取・提出・条件	備考
尿 中 一 般 検 査	79352 52	尿蛋白定量 (随時) 尿蛋白定量 (蓄尿)	ビロロルット法 随時尿 10mg/dL 未満 蓄尿 21~120mg/day	尿 3.0mL	d	冷蔵	1日	①当日中に提出できない場合は冷暗所に保存して下さい。冷所保存により塩類が析出することがあります。 ②尿を化学的検査のために蓄尿するときは、24時間尿に対して2~3mLの防腐剤(トLI)などをお使い下さい。 ③尿蛋白とクレアチン同時依頼の場合は、クレアチン補正值の報告可	
	79354 56	尿糖定量 (随時) 尿糖定量 (蓄尿)	酵素法 ヘキソキナーゼ・ UV法 随時尿 40mg/dL 未満 蓄尿 40~85mg/day	尿 3.0mL	d	冷蔵	1日		
	79142	尿沈渣	鏡検法 (染色標本法) WBC<3/HPF RBC<1/HPF	随時尿 1.0mL 【厳守】	d	室温	1日		① 尿中有形成分は不安定で壊れやすいため、採尿後は速やかに提出して下さい。 <u>当日出検厳守のこと。</u> ② 採尿後の尿の保存状態によっては外部からの混入により、尿路由来以外のものが認められることもあります。 ③ 尿量は直接検査結果に影響します。1.0mL 以下の場合、参考値となりません。

項目名	臨床的意義
-----	-------

尿蛋白定量	<p>1. 尿中に排泄される蛋白は正常ではごく微量（数10mg/day）。150mg/day以上では病的蛋白尿とされる。</p> <p>(↑) ①腎前性…多発性骨髄腫、溶血性疾患、L鎖病、単球性白血病 ②腎性…糸球体障害（糸球体腎炎、ネフローゼ症候群、腎硬化症）、尿細管障害（fanconi症候群、wilson病）、間質障害（薬剤アレルギー） ③二次性腎疾患…ループス腎炎、糖尿病性腎症、アミロイド腎 ④腎後性…前立腺炎、膀胱炎、結石、腫瘍、ファラリア症</p>
-------	--

尿糖定量	<p>1. 腎での糖排泄限界は170mg/dL前後といわれ、血糖値がこの域値以上となると糸球体での濾過量が再吸収を超え尿中にブドウ糖が遊出する。</p> <p>2. 血糖値が正常でも、糖域値が低下すれば尿中に糖が排泄される。</p> <p>(↑) 糖尿病（IDDM、NIDDM、その他）、末端肥大症や甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患、肝硬変胃切除後、急性・慢性膵炎、慢性腎炎、ネフローゼ症候群、カドミウムや抗生剤による腎障害</p>
------	--

1. 10mLの尿を遠心分離し、沈渣標本を作成し、鏡検により尿中の有形成分の有無及び数量、形態的特徴を調べる。数量表記は（400×）の強拡大当り（/HPF）が基準となり、他に（100×）の弱拡大（/LPF）も使用される。

表6. 尿沈渣で検出される成分と関連する疾患

種別	成分名	参考基準値	関連する疾患
血球成分	白血球	<3/HPF	炎症性疾患(好中球、腎結核(リンパ球+)、間質性腎炎(好酸球+)など好中球は膀胱炎や腎盂腎炎で、輝細胞(グリッター細胞)として認められる
	赤血球	<1/HPF	大部分の腎・尿路疾患、出血性疾患、変形赤血球は糸球体性血尿
上皮細胞	扁平上皮	0~少数	—
	尿路上皮※	0~少数	腎盂から膀胱までの炎症、結石症、腫瘍
	尿細管上皮	0	尿細管障害
	円柱上皮	0~少数	正常、尿道炎、前立腺炎、月経時混入
	封入体含有細胞	(-)	ウイルス感染や細胞の変性
円柱	硝子円柱	0~少数	少数なら正常
	白血球円柱	0	腎盂腎炎
	赤血球円柱	0	急性腎炎、腎出血時
	顆粒円柱	0	慢性腎炎、ネフローゼ、ある程度病勢を反映する
	上皮円柱	0	尿細管の病変、尿細管腔の閉塞
	ろう様円柱	0	腎盂腎炎末期、ネフローゼ症候群
	脂肪円柱	0	ネフローゼ症候群、ループス腎炎、糖尿病性腎炎
その他	卵円形脂肪体	(-)	ネフローゼ症候群
	細菌、真菌、トリパノ原虫	(-)	
	脂肪球	(-)~(+)	感染症
	粘液糸	(-)~(+)	発熱時など
結晶	病的：シスチン(シスチン尿症、アミノ酸代謝障害)、ビリルビン(肝障害)、尿酸(痛風腎)		
	チロシン・ロイシン(重症肝障害)、コレステロール結晶・脂肪酸結晶(ネフローゼ症候群など)		
	正常：リン酸塩、尿酸塩、シュウ酸Caなど(腎結石で多量のシュウ酸Caが出現)、各種薬剤結晶		

※ 2012年日臨技指針より移行上皮は尿路上皮へ名称変更

尿・糞便 検査

	J-ド No.	項目名 (別名・略称)	検査方法 基準範囲	検体名 必要量	容 器	保 存	所要 日数	採取・提出・条件	備 考
糞 便 検 査	79358	便中 ヒトヘモグロビン (免疫学的潜血検査)	仏ノカマトグ ラフィー法 (ICA金コロイド法) (-)	便適量	L	冷蔵	1日	当日中に提出できない場合は冷蔵(2~8℃)にて保存してください。	
	79359	2回目							
	79209	寄生虫(卵) 塗抹検査 (塗抹標本法)	厚層塗抹法 (-)	便 小指頭大	M	冷蔵	1日		
	79206	蟻虫(卵)検査 (セロファン [®] 検肛法)	セロファン [®] 検肛法 (2日法) (-)	専用 セロファン	U	室温	1日	必ず排便前に採取してください。 採取方法はセロファン袋に記載あり。	

項目名	臨床的意義
便中 ヒトヘモグロビン	<ol style="list-style-type: none"> 1. ヒトヘモグロビンに特異的な免疫学潜血検査。食事制限の必要はなし。 2. 大腸癌検診のスクリーニングとして利用されることが多い。 3. 新鮮な便が条件であることは、従来の化学的方法と変わらない。生理中および生理後3日以内の検体は不適。また、血尿および血友病の患者の場合に偽陽性になることがある。
虫卵塗抹検査	<ol style="list-style-type: none"> 1. 厚層塗抹法は蛔虫卵などの産卵数の多い虫卵の検出に有効である。 <p>【参考】 各種寄生虫の1日の産卵数</p> <ul style="list-style-type: none"> ・蛔虫受精卵…20～30万 ・蛔虫不受精卵…6～11万 ・アメリカ鉤虫…5千～1万 ・鞭虫…900 ・ズビニ鉤虫…1～1.5万 ・東洋毛様線虫…50～260 ・糞線虫…約60 ・蟯虫…6千～1万 ・肝吸虫…4.2千～7千 ・肺吸虫…1～2万 ・横川吸虫…280 ・広節裂頭条虫…100万
蟯虫卵検査	<ol style="list-style-type: none"> 1. 蟯虫は肛門の周囲に産卵する習性があり、糞便中の検出が困難なためセロファンによる肛門検査法が採用されている。一般に家族内感染が多いので、陽性者に対しては家族全員の駆虫が奨励されている。